

# Embarazos psicológicos en perras

---

[www.clinicaveterinariafuenteelsaz.com](http://www.clinicaveterinariafuenteelsaz.com)



**Sara Gil Edwards. Colegiada nº5327**

**HOSPITAL VETERINARIO FUENTE EL SAZ**

Calle Torrelaguna, 45

28140 Fuente el Saz (Madrid)

Teléfonos: 91.620.00.98. y 609.04.53.84

# Embarazos psicológicos en perras

www.clinicaveterinariafuentesaz.com

## · Definición

Se trata de una alteración que se puede manifestar en algunas perras tras la fase de ovulación. En las gatas la ovulación es inducida por la monta con el macho por lo que no se pueden dar este tipo de procesos ya que requiere que hayan ovulado antes.



## · Sintomatología

Suele aparecer dos meses después del celo, de forma que la hembra adopta actitudes y actúa como si hubiera parido dando lugar a una serie de síntomas como: inapetencia, nerviosismo, vómitos, alteración... y presenta gran cantidad de secreción láctea. En algunos casos adoptan objetos como muñecos, trapos, colocándolos como si fueran a amamantarlos.

Los embarazos psicológicos o pseudogestaciones son desarreglos hormonales que se dan en algunas perras. Durante el celo en las perras se produce la formación de varios óvulos con sus correspondientes cuerpos lúteos, siendo los responsables de producir progesterona (hormona fundamental para mantener una gestación), tanto en los casos en los que la perra se queda preñada como en los que no. En un celo normal, los cuerpos lúteos de las perras no preñadas se van desgastando y la progesterona se va reduciendo hasta que desaparece quedando el útero y los ovarios preparados para un nuevo ciclo.

En las perras con pseudogestación, los niveles de progesterona no disminuyen, de forma que comienza a formarse prolactina a partir de los 2 meses desde el celo generándose leche para prepararse para el parto que no se producirá.

## · Tratamiento

Es importante acudir al veterinario enseguida para que una vez descartada una posible gestación mediante ecografía, le administre el tratamiento adecuado para evitar que se le produzca a la perra una mastitis derivada de la secreción láctea fuera de la gestación.

Con el tratamiento adecuado, los síntomas desaparecen a las 2 semanas y la secreción láctea remite completamente así como todos los síntomas.

El tratamiento consistirá en la administración de derivados ergolínicos (hormonas) que harán disminuir la secreción de prolactina, haciendo remitir la secreción láctea.

## · Prevención

El hecho de que alguna de nuestras perras padezca este tipo de procesos no significa que necesiten psicológicamente ni fisiológicamente ser madres y parir. El cruzarlas no evitará que padezcan las pseudogestaciones.

La única forma de evitar este tipo de patologías que suelen repetirse tras cada celo es con la esterilización de las hembras entre los celos, en fase de anoestro o de inactividad ovárica. Se evitarán así la posible aparición de tumores mamarios derivados de los continuos cambios en las mamas fuera de gestaciones.